

20th KUASS
(Kyoto University African Studies Seminar)

*日本語の概要は2ページ目にあります

Tobacco and Health: An Overview of Tobacco Control in Zambia

Date: Jan 10 (Fri), 2014, 15:00 – 17:00

Venue: #318 seminar room, 3F Inamori Bldg.,
Kawabata Campus, Kyoto University

Presenter : Richard Zulu

(University of Zambia, visiting Associate Professor of ASAFAS, Kyoto University)

Abstract: Tobacco is a major public health concern worldwide and a major leading cause of preventable deaths. Methods used are review of survey results from the 2002, 2007 and 2011 Global Youth Tobacco Survey (GYTS) and a desk review. The GYTS included school grades 7, 8 and 9. The never smokers likely to initiate smoking in the next year were 22.6%. About 19.1% of the students had ever smoked cigarettes. About 22% of students reported that one or more of their parents smoke. Among some of the students who were current smokers some reported wanting a cigarette first thing in the morning, an indicator of nicotine addiction. Some students reported being offered free cigarettes by a tobacco company representative. Zambia has made tobacco use prevention a primary health issue as evidenced by the ratification of the World Health Organization (WHO) Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) on 28th May 2008. There is need to have a comprehensive tobacco control law which is FCTC compliant. Findings presented in this paper show that there is need for interventions towards tobacco control amongst young people who represent the ages of tobacco use initiation.

Co-hosted with the Research Cluster on Southern Africa of Japan Society for the Promotion of Science Grant-in-Aid for Scientific Research (S) “Comprehensive Area Studies on Coexistence and Conflict Resolution Realizing the African Potentials” (The representative, Prof. Ohta Center for African Area Studies, Kyoto Univ.)

たばこと健康： ザンビアにおける喫煙行動のコントロールに関する研究

日時：2014年1月10日（金）15時～17時

場所：京都大学 稲盛記念館 318号室

発表者：リチャード・ズール(ザンビア大学、ASAFAS 客員准教授)

要旨：たばこの喫煙は、世界各地で健康問題を引き起こしているが、予防できるものである。2002年、2007年、2011年に実施された青少年の喫煙に関する国際調査によると、7～9年生で喫煙経験のない生徒のうち22.6%が翌年に喫煙しており、今までに紙巻きたばこを吸ったことのある生徒は19.1%であった。22%の生徒は、両親あるいは父親か、母親のいずれかが喫煙していると回答をした。喫煙する生徒のなかには、朝にまず、たばこを吸いたくなるという、ニコチン中毒の症状を示す者も含まれている。たばこ会社の無償提供によって紙巻きたばこをもらった生徒もいる。ザンビアは2008年5月28日に、WHO（世界保健機関）のたばこ規制枠組み条約(FCTS)に批准し、たばこによる健康被害の防止に努めている。FCTSに沿った包括的なたばこの喫煙を制限する法律が必要である。本発表のなかでは、若年層によるたばこの喫煙行動の規制の必要性を示していきたい。

この研究会は、科学研究費補助金基盤研究(S)「アフリカの潜在力を活用した紛争解決と共生の実現に関する総合的地域研究」(研究代表者 太田至)、南部アフリカ・クラスターとの共催である。